



Prodotti trivalenti contenenti gli antigeni Difterite, Tetano e Pertosse formulazione tipo adulti

	Triaxis® (Sanofi)	Boostrix® (GSK)	Tribaccine® AJ vaccines A/S
Pronto all'uso	Sì	Sì	Sì
Difterite	Non meno di 2 UI	Non meno di 2 UI	Non meno di 2 UI
Tetano	Non meno di 20 UI	Non meno di 20 UI	Non meno di 20 UI
Pertosse	PT 2,5µg	PT 8µg	PT 20µg
	FHA 5µg	FHA 8µg	-
	PRN 3 µg	PRN 2,5µg	-
	FIM type 2,3 5µg	-	-
Adiuvante	0,33 mg fosfato di Al ³⁺	0,3 mg idrossido di Al ³⁺ idrato 0,2 mg fosfato di Al ³⁺	0,5 mg di Al
Indicazione specifica 4.1	Richiamo da 4 anni di età	Richiamo da 4 anni di età	Richiamo da 4 anni di età
4.2 Posologia			
Soggetti non vaccinati o vaccinati in modo incompleto per difterite e tetano	-	Ciclo vaccinale a 0,1,6 mesi	-
Soggetti non vaccinati o vaccinati in modo incompleto per pertosse	Effetto booster solo in soggetti già vaccinati o che hanno contratto l'infezione naturale	-	Effetto booster solo in soggetti già vaccinati o che hanno contratto l'infezione naturale
Profilassi anti-tetanica post-esposizione	Sì	Sì	Sì
4.5 Interazioni			
Uso con altri vaccini	HPV; Epa B; Flu inattivato; OPV/ IPV	HPV	-
4.6 Fertilità, gravidanza e allattamento			
Gravidanza	Sì	Sì	Sì
Dati clinici			
Immunogenicità e sicurezza	Da 4 a 64 anni	Da 4 a 76 anni	Da 4 a 55 anni
Persistenza anticorpale	Sì	Sì	-

https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_000200_034813_RCP.pdf&retry=0&sys=m0b113
https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_004285_039760_RCP.pdf&retry=0&sys=m0b113
https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_004314_042607_RCP.pdf&retry=0&sys=m0b113

