

ASL Lecce

Unità Operativa di Radiologia  
Presidio Ospedaliero di Galatina  
Dir. Dott.G.M.Maggio

**INFORMAZIONI per i pazienti con generica predisposizione allergica  
da sottoporre a TC con mezzo di contrasto iodato endovena**

La diatesi allergica aumenta il rischio di intolleranza al contrasto iodato.

Nei pazienti con reazione allergica in corso o asma bronchiale il rischio di reazioni avverse al contrasto iodato è notevolmente aumentato.

Vanno sempre attentamente valutati dal medico curante e dal medico radiologo il rapporto rischio/beneficio e la possibilità di ricorrere ad indagini alternative : se ciò non fosse possibile, può essere utile effettuare, prima dell'esame con mezzo di contrasto iodato, una premedicazione con farmaci antiistaminici e cortisonici.

Si riporta ,a titolo di esempio per il medico curante, il seguente protocollo:

48 h - 36h - 24h - 13h – 7h - 1h prima dell'esame TC :

ZANTAC 150 mg 1 cp

DELTACORTENE 25 mg 2 cp

TRIMETON 1 cp o FORMISTIN 1 cp o ROBILAS 1 cp

1-2 h prima dell'esame , BENTELAN 4 mg fiale e.v.

Ulteriori precauzioni utili a ridurre le reazioni avverse la mezzo di contrasto iodato sono :

1) SOSPENDERE 2 GIORNI PRIMA ACE INIBITORI E BETA BLOCCANTI, INTERLEUKINA 2  
METFORMINA-FENFORMINA, DOPO NULLA OSTA CARDIOLOGICO E DIABETOLOGICO

2) UTILIZZARE MDC IODATO A BASSO PESO MOLECOLARE.

3) EFFETTUARE L'INDAGINE IN AMBIENTE OSPEDALIERO

**I pazienti con allergia specifica allo iodio devono essere indirizzati verso indagini alternative o, in caso di estrema necessità, devono eseguire l'indagine in Centri Ospedalieri dotati del reparto di Rianimazione.**

**N.B. LA PREMEDICAZIONE NON ESCLUDE IN MANIERA ASSOLUTA LA COMPARSA DI UNA REAZIONE AVVERSA LIEVE O GRAVE AL CONTRASTO IODATO.**

Il Radiologo