



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Lungomare Starita n.6 Bari

CAMPAGNA ANTINFLUENZALE: 2013 -2014

L'influenza, in Europa, si presenta con epidemie annuali durante la stagione invernale ed è associata ad elevata morbilità e mortalità. In Italia il fenomeno influenzale interessa ogni anno il 4-12% della popolazione e costituisce un rilevante problema di sanità pubblica. Le vaccinazioni rivestono un ruolo essenziale nel contenimento della diffusione dell'influenza stagionale, contribuendo in modo sostanziale alla prevenzione del fenomeno.

Con circolare del 19 agosto 2013, il Ministero della Salute – Dipartimento della Prevenzione e della Innovazione Direzione Generale della Prevenzione – ha trasmesso alle Regioni le disposizioni aventi nell'oggetto la “Prevenzione e controllo dell'influenza: raccomandazioni per la stagione 2013-2014” . Nel documento si evidenzia che l'Organizzazione Mondiale della Sanità indica quale obiettivo primario della vaccinazione antinfluenzale la prevenzione delle forme gravi e complicate di influenza e la riduzione della mortalità prematura in gruppi ad aumentato rischio di malattia grave; una strategia vaccinale basata su questi presupposti presenta un favorevole rapporto costo-beneficio e costo-efficacia.

Vaccinarsi è il modo migliore di prevenire e combattere l'influenza, sia perché aumentano notevolmente le probabilità di non contrarre la malattia sia perché, in caso di sviluppo di sintomi influenzali, questi sono molto meno gravi e, generalmente, non seguiti da ulteriori complicanze.

Il [Ministero della Salute](#) raccomanda la vaccinazione alle persone con età maggiore di 64 anni e a coloro che sono in stretto contatto con anziani, a tutte le persone a rischio di complicazioni secondarie a causa dell'età o di patologie, come disordini cronici di tipo respiratorio o polmonare (asma compreso), malattie metaboliche croniche (diabete mellito, disfunzioni renali, immunodepressione dovuta o meno ai farmaci, patologie emopoietiche, sindrome da malassorbimento intestinale, fibrosi cistica, malattie congenite o acquisite che

comportino carente produzione di anticorpi) o quando sono previsti interventi chirurgici di una certa entità.

Inoltre, il vaccino è fortemente raccomandato a bambini a partire dai sei mesi d'età ed agli adolescenti (fino ai 18 anni d'età) che sono stati sottoposti ad una terapia a lungo termine a base di aspirina (acido salicilico) perché l'uso di questo farmaco aumenta la probabilità di sviluppare, successivamente all'infezione influenzale, la sindrome di Reye.

Infine la vaccinazione è raccomandata per tutti coloro che svolgono funzioni lavorative di primario interesse collettivo o che potrebbero trasmettere l'influenza a persone ad alto rischio di complicanze.

L' avvio della campagna di vaccinazione antinfluenzale è previsto a partire dal 4 Novembre, data di consegna del vaccino presso le sedi Distrettuali , Dipartimentali e Farmaceutiche .

DESTINATARI DELL'OFFERTA.

La vaccinazione è offerta **ATTIVAMENTE E GRATUITAMENTE** a:

- persone di età pari o superiore a 65 anni
- persone di tutte le età con patologie di base che aumentano il rischio di complicanze in corso di influenza ;
- persone non a rischio che svolgono attività di particolare valenza sociale.

I MMG e PLS provvederanno alla vaccinazione antinfluenzale dei soggetti di età superiore a sei mesi con patologie a rischio e agli ultra sessantaquattrenni .

TIPOLOGIA DEI VACCINI.

Per la campagna vaccinale 2013/2014 la ASL di Bari intende seguire oltre le indicazioni del PNPV 2012/14 le linee guida ministeriali che, nella parte relativa alla descrizione delle tipologie dei vaccini, delineano (paragrafo 2.2.4.) profilo e indicazioni specifiche dei prodotti disponibili e in particolare :

- ▲ **VACCINO SPLIT (VAXIGRIP da 0,50 ml)** che l'ASL di Bari intende riservare ai bambini a partire da 6 ° mese di vita ; nella fascia di età di 6 -36 mesi verrà utilizzata la mezza dose adulti (0.25 ml);
- ▲ **VACCINO VIROSOMALE (INFLEXAL V da 0.50ml)** che trova buon riscontro nell'offerta vaccinale da parte del territorio e degli ambulatori vaccinali per la flessibilità della fascia utilizzo e che questa ASL indica per la vaccinazione di soggetti al di sotto dei 65 anni a rischio di patologie croniche, compresi i bambini dai 6 anni in su, adolescenti e giovani adulti;

- ▲ VACCINO ADIUVATO CON M59 (FLUAD) che questa ASL indica per la vaccinazione di tutti i soggetti di età superiore ai 64 anni con particolare indicazione per l'immunizzazione dei soggetti anziani e di quelli poco rispondenti ;
- ▲ VACCINO INTRADERMICO (INTANZA 15µg) che trova indicazione specifica “ anche nei pauci-rispondenti alla somministrazione intramuscolare “ e in particolare nei soggetti defedati con ipotrofia muscolare, affetti da diatesi emorragica o da malattie neurologiche, soggetti emotivamente sensibili a pratiche iniettive, grandi obesi .E' indicato per i soggetti oltre i 60 anni di età.

Si evidenzia che in tutte le fasce d'età (ad esclusione dell'infanzia), si somministra una sola dose di vaccino, sia a coloro che non sono mai stati vaccinati sia ai soggetti che hanno già effettuato precedentemente la vaccinazione.

OBIETTIVI GENERALI :

- la riduzione del rischio individuale di malattia, di ospedalizzazione e di morte;
- la riduzione dei costi sociali connessi a morbosità e mortalità.

OBIETTIVI DI COPERTURA per tutti i gruppi target:

- il 75% come obiettivo minimo perseguibile
- il 95% come obiettivo ottimale

CAMPAGNA VACCINALE ANTIPNEUMOCOCCICA

VACCINI UTILIZZATI:

- Vaccino coniugato 13 VALENTE (PREVENAR 13)
- 23 VALENTE (PNEUMO 23)

POPOLAZIONE TARGET:

La popolazione target dell'offerta è rappresentata dai soggetti di età superiore a 64 anni e dagli adulti di 50 anni di età, oltre che a rischio di contrarre la malattia pneumococcica per la presenza di patologie o condizioni predisponenti:

- cardiopatie croniche
- malattie polmonari croniche
- cirrosi epatica, epatopatie da alcolismo
- diabete mellito

- fistole liquorali
- anemia falciforme e talassemia
- immunodeficienza congenite e acquisite
- asplenia anatomica e funzionale
- leucemia, linfomi, mieloma multiplo
- neoplasie diffuse
- trapianto d'organo o di midollo
- immunosoppressione iatrogeno clinicamente significativa
- insufficienza renale cronica
- HIV positivi
- portatori di impianto cocleare

Nel corso del 2013 l'offerta attiva e gratuita del vaccino antipneumococcico è rivolta alle coorti 1938, 1943, 1948 ; lo standard di copertura è fissato per tutte e tre le coorti al 60%. L'offerta gratuita è garantita anche a tutte le coorti < 1938 .

E' previsto per l'anno 2013 anche il recupero di tutti i soggetti non vaccinati per le età previste nella campagna vaccinale dello scorso anno .

RIFERIMENTI NORMATIVI.

Piano Nazionale Prevenzione Vaccini 2012-2014

DGR 241/13 del 18/02/2013 - "Calendario vaccinale per la vita"

Circolare Ministeriale - dgpre 0018296-p DEL 09/08/2013

Regione Puglia - Nota assessorile prot AOO152/ n.11926 del 04/10/2013 (all .1)

Regione Puglia - Nota assessorile prot AOO152/ n.3731 del 13/03/2012

DGR 241/13 del 18/02/2013 - "Calendario vaccinale per la vita"

Regione Puglia - Nota assessorile prot AOO152/ n.11926 del 04/10/2013

Siti web :

www.sitiappulolucana.it sito della Società Italiana di Igiene- Medicina Preventiva Sezione tematica -vaccinazioni

www.vaccinarsi.org - VaccinarSi a cura della SITI Società di Igiene di Igiene ;

www.salute.gov.it- sito ufficiale del Ministero della Salute- tematica Area Tematica Prevenzione - Profilassi Malattie Infettive e vaccinazioni;

www.epicentro.iss.it- sito ufficiale Istituto Superiore di Sanità

A cura del Dipartimento di Prevenzione ASL BA