

ALLEGATO 4



POSSIBILI “*SEGNI PREMONITORI*” DI ALTO RISCHIO DI SUICIDIO

(IL PRESENTE ALLEGATO È PARTE INTEGRANTE DELLA DOCUMENTAZIONE CLINICA IN USO SU TUTTO IL TERRITORIO AZIENDALE DELLA ASL BARI)

| |
|---|
| ➤ Difficoltà di ragionamento |
| ➤ Commenti o battute sul suicidio |
| ➤ Affermazioni concernenti l'assenza di speranza e di significato |
| ➤ Affermazioni che mostrano senso di inutilità e di impotenza |
| ➤ Comportamenti inusuali come fare, senza motivo apparente e improvvisamente, richiesta di uscire dal reparto, dono di oggetti cari, saluti particolari, ecc. |
| ➤ Incapacità nella risoluzione di problemi, anche tra i più comuni e semplici da risolvere |
| ➤ Atteggiamenti di disperazione, rabbia, bassa stima di sé |
| ➤ Scarso interesse per cura personale |
| ➤ Autodenigrazione |
| ➤ Percezione che gli eventi siano catastrofici |
| ➤ Ipergeneralizzazione |
| ➤ Indifferenza |
| ➤ Lettura degli eventi come fatti personali |
| ➤ Agitazione o rallentamento psicomotorio |
| ➤ Fasi di agitazione verbale e/o psicomotoria alternate a fasi di calma apparente |
| ➤ Apatia |
| ➤ Insonnia o ipersonnia |
| ➤ Scarso controllo degli impulsi |
| ➤ Aggressività, anche repressa e autodiretta |
| ➤ Ridotta capacità di giudizio |
| ➤ Allucinazioni, soprattutto se concernenti il suicidio |
| ➤ Pensieri di rovina |
| ➤ Senso di colpa |
| ➤ Mancanza o perdita di progetti per il futuro |
| ➤ Eccessiva attenzione alla donazione degli organi |
| ➤ Fantasie di morte sempre più frequenti e consolidate |
| ➤ Eccessivo interesse o disinteresse per la religione o recente cambio di atteggiamento nei confronti della stessa |
| ➤ Possesso maniaco di farmaci |
| ➤ Pensiero fisso di fare testamento o di sistemare i propri affari |