



ASL Taranto

PugliaSalute

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Direttore: Dott. Michele Conversano

Via Leonida n. 2 – 74121 Taranto

e-mail: diprev.segreteria@asl.taranto.it

PEC: dipartprevenzione.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it

Ai Direttori dei Distretti Socio Sanitari ASL TA

DSS TA Unico

Dr. Guido Cardella

DSS TA 01

Dr.ssa Maria Pupino

DSS TA 02

Dr. Gianrocco Rossi

DSS TA 05

Dr.ssa Saveria Esposito

DSS TA 06

Dr.ssa Giuseppina Ronzino

DSS TA 07

Dr.ssa Gloria Anna Saracino

**E per il loro tramite a tutti i Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta
ASL TA****Oggetto: raccomandazioni operative per il contenimento del rischio di trasmissione del morbillo**

La recente segnalazione di 6 casi di morbillo ospedalizzati nel nostro territorio provinciale suggerisce che, anche nella Provincia di Taranto, è in atto una **ripresa della circolazione virale del morbillo** in linea con il *trend* epidemiologico nazionale.

In tal senso, al fine di evitare l'accensione di focolai epidemici è importante sottolineare che la tempestività della diagnosi e della successiva notifica, da effettuare anche di fronte al solo sospetto clinico di morbillo, rappresentano elementi cruciali in termini di prevenzione. Pertanto, in questo contesto e in conformità con le indicazioni ministeriali, si consiglia di **allertare tutti i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta affinché venga elevato il sospetto diagnostico in relazione al morbillo** per tutti i pazienti che presentano febbre alta, tosse, congiuntivite, linfadenopatia (cervicale, suboccipitale e retroauricolare), esantema



ASL Taranto

PugliaSalute

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Direttore: Dott. Michele Conversano

Via Leonida n. 2 – 74121 Taranto

e-mail: diprev.segreteria@asl.taranto.it

PEC: dipartprevenzione.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it

maculo-papulare, ponendo attenzione anche a ricercare le macchie di *Koplik* sulla mucosa buccale.

Si ricorda, infatti, che secondo la Circolare Ministeriale 0033189 del 12/11/2018 “Aggiornamento del sistema di sorveglianza integrata del morbillo e della rosolia, per il rafforzamento degli obiettivi di eliminazione”, è indispensabile il coinvolgimento dei Pediatri di Libera Scelta, dei Medici di Medicina Generale e dei Medici Ospedalieri, assicurando la loro adeguata informazione circa le procedure previste. I medici devono:

- raccogliere informazioni cliniche complete su ogni caso sospetto di morbillo e rosolia (inclusa la presenza dei sintomi che fanno parte delle definizioni di caso di entrambe le malattie);
- segnalare ogni caso sospetto alla ASL entro 12 ore via e-mail (malinf@asl.taranto.it);
- raccogliere, se possibile, campioni biologici (sangue, urine, saliva, tampone faringeo) per la conferma di laboratorio dei casi sospetti durante il primo contatto con il paziente;
- informare il paziente (casi clinici di morbillo o rosolia) che verrà contattato da un operatore ASL per l'indagine epidemiologica.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti

Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione

Dr. Michele Conversano