

ALLEGATO 1

I vaccini antinfluenzali saranno disponibili per i Medici di MG ed i Pediatri di LS della ASL di Taranto, dal giorno 8/10/2024 secondo il seguente calendario:

Per i Medici di MG e Pediatri di LS di Castellaneta, Ginosa, Laterza e Palagianello (Distretto SS 1)

Ginosa	Via Palatrasio c/o DSS	Martedì 08/10 dalle 14,30 alle 17,00
--------	------------------------	--------------------------------------

Per i Medici di MG e Pediatri di LS di Massafra, Mottola, Statte e Palagiano (Distretto SS 2)

Massafra	Viale Magna Grecia 173, c/o Ospedale	Martedì 08/10 dalle 14,30 alle 17,00
----------	--------------------------------------	--------------------------------------

Per i Medici di MG e Pediatri di LS di Martina Franca e Crispiano (Distretto SS 5)

Martina Franca	Via Toniolo 6/R	Martedì 08/10 dalle 14,30 alle 17,00
----------------	-----------------	--------------------------------------

Per i Medici di MG e Pediatri di LS di Grottaglie, Montemesola, Monteiasi, Roccaforzata, Monteparano, San Giorgio Jonico, San Marzano di San Giuseppe, Carosino (Distretto SS 6)

Grottaglie	Via Portelle delle Ginestre angolo 1° Maggio	Martedì 08/10 dalle 14,30 alle 17,00
Pulsano	Via Calati s.n.c. c/o Distretto Per i MMG e PLS di Pulsano, Leporano, Faggiano	Martedì 08/10 dalle 14,30 alle 17,00

Per i Medici di MG e Pediatri di LS di Manduria, Sava, Torricella, Maruggio, Lizzano, Fragnano, Avetrana (Distretto SS 7)

Manduria	Via San Gregorio Magno ang. Piazza della Pietà (ex palazzo Scialpi)	Martedì 08/10 dalle 14,30 alle 17,00
----------	---	--------------------------------------

Per i Medici di MG e Pediatri di LS afferenti al Distretto Unico di Taranto città

Taranto	Via Federico di Palma, 166	Martedì 08/10 dalle 14,15 alle 17,00
---------	----------------------------	--------------------------------------

La distribuzione avverrà secondo gli orari indicati e si raccomanda ai Sigg. Medici di MG e Pediatri di LS di usufruire della apertura dedicata alla distribuzione del vaccino, con la presenza di personale specificamente incaricato, per non sovrapporsi all'attività istituzionale del Dipartimento di Prevenzione.



ALLEGATO 2.1

1. CAMPAGNA DI VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE 2024/25

Anche per quest'anno l'Azienda Sanitaria Locale di Taranto ha avviato l'organizzazione della campagna di vaccinazione antinfluenzale con il principale intento di **raggiungere l'obiettivo di copertura vaccinale del 75% della popolazione di riferimento** (ultrasessantacinquenni e soggetti a rischio per patologia) nell'ambito del territorio provinciale, così come indicato nella Circolare Ministeriale "Prevenzione e controllo dell'influenza: raccomandazioni per la stagione 2024/2025".

La prossima campagna di vaccinazione antinfluenzale avrà **inizio a partire dal 8 ottobre 2024 e dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2024.**

I vaccini in consegna per la campagna di vaccinazione antinfluenzale per la stagione 2024/2025 secondo le indicazioni dell'Assessorato della Regione Puglia sono:

VACCINO	DOSE E FORMULAZIONE	INDICAZIONE
VAXIGRIP TETRA	vaccino tetravalente tipo split inattivato, non adiuvato, contro 4 ceppi di virus (due sottotipi del virus A e due tipi del virus B), disponibile in siringa preriempita da 0,5 ml.	Soggetti immunocompetenti dai 18 anni ai 64 anni
		Soggetti fragili di età < 50 anni
FLUAD TETRA	vaccino tetravalente inattivato a subunità adiuvato con MF59 formulazione da 0,50 ml. La funzione dell'adiuvante è quella di potenziare la risposta immunitaria alla vaccinazione; per questo trova particolare indicazione per l'immunizzazione dei soggetti anziani.	Soggetti immunocompetenti di età compresa fra i 65 anni e 84 anni
		Soggetti fragili di età compresa tra 50 e 84 anni

EFLUELDA	vaccino ad alto dosaggio è un vaccino split quadrivalente che contiene due virus di tipo A (H1N1 e H3N2) e due virus di tipo B contenente 60 mcg di emoagglutinina (HA) per ciascun ceppo virale per garantire una maggiore risposta immunitaria e quindi una maggiore efficacia.	Soggetti ≥ 85 anni
FLUENZ (SOLO SU RICHIESTA)	vaccino trivalente antinfluenzale vivo attenuato somministrato con spray intranasale	Soggetti fragili di età compresa tra 7 e 17 anni

Ulteriori informazioni su tipologia, dosaggio e modalità di somministrazione dei vaccini sono riportate nella Circolare Ministeriale *"Prevenzione e controllo dell'influenza: raccomandazioni per la stagione 2024/2025"*.

ALLEGATO 2.2

2. CAMPAGNA DI VACCINAZIONE ANTIPNEUMOCOCCICA 2024/25

Nel soggetto ultrasessantacinquenne è necessario offrire attivamente la vaccinazione con **vaccino pneumococcico coniugato (PCV20)**, seguita da una dose di vaccino polisaccaridico (PPSV23) ad almeno 8 settimane di distanza. L'obiettivo di copertura posto dal PNPV è, come per l'antinfluenzale, del 75%. Va posta attenzione a non invertire l'ordine di somministrazione dei due vaccini, perché ciò comporterebbe una peggiore risposta immunitaria, pertanto si consiglia di procedere come di seguito descritto:

- **Coorte nati 1959 e over 65 anni mai vaccinati contro lo pneumococco – Offerta attiva PCV20 (PREVENAR 20 – ex APEXXNAR) seguito ad almeno due mesi da una dose di PPSV 23 – PNEUMOVAX**
- **I vaccinati con PCV 13 e che hanno eseguito la sequenziale con PPSV23 NON devono eseguire ulteriore vaccinazione anti-pneumococcica**

La presenza di patologie predisponenti può indurre un aumentato rischio di infezione pneumococcica severa e delle sue complicanze. Di conseguenza la vaccinazione anti-pneumococcica con **schedula sequenziale (PRIMA UNA DOSE DI PCV20 – PREVENAR 20, SEGUITA DA UNA DOSE DI PPSV 23 – PNEUMOVAX A DISTANZA DI ALMENO 2 MESI)** è consigliata, secondo il nuovo Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale, a tutti coloro che presentino le seguenti patologie o condizioni predisponenti:

- Alcoolismo cronico
- Asplenia anatomica o funzionale e candidati alla splenectomia
- Cardio/pneumo/epatopatie croniche
- Diabete mellito
- Emoglobinopatie quali anemia falciforme e talassemia
- Epatopatie croniche, inclusa la cirrosi epatica e le epatopatie croniche evolutive da alcool
- Immunodeficienze congenite o acquisite
- Infezione da HIV
- Insufficienza renale/surrenalica cronica, sindrome nefrosica



ASL Taranto

PugliaSalute

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Direttore: Dott. Michele Conversano

Via Leonida n. 2 – 74121 Taranto

E-mail: diprev.segreteria@asl.taranto.it

PEC: dipartprevenzione.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it

Direttore: Dott. Michele Conversano

- Malattie polmonari croniche
- Neoplasie diffuse
- Patologie onco-ematologiche (leucemie, linfomi e mieloma multiplo)
- Patologie richiedenti un trattamento immunosoppressivo a lungo termine
- Portatori di impianto cocleare
- Soggetti con perdite liquorali da traumi o intervento
- Trapianto d'organo o di midollo
- Difetti congeniti e acquisiti del complemento

ALLEGATO 2.3

3. CAMPAGNA DI VACCINAZIONE ANTI HERPES ZOSTER

Il calendario vaccinale per la vita della Regione Puglia prevede l'offerta attiva e gratuita del vaccino anti-zoster (adiuvante ricombinante - **SHINGRIX** - due dosi 0, 2-6 mesi) a tutti i sessantacinquenni. Negli ultimi mesi del 2024, dunque, l'offerta sarà rivolta per età esclusivamente ai nati nel 1959, mentre a partire dal 1° gennaio 2025 tale vaccinazione dovrà essere proposta e somministrata gratuitamente anche ai nati nel 1960. Inoltre, poiché la presenza di alcune condizioni morbose può aumentare il rischio di sviluppare le manifestazioni cliniche legate alla patologia, o aggravarne il quadro sintomatologico, la vaccinazione deve essere offerta attivamente a tutti i pazienti affetti dalle patologie incluse nell'elenco sotto riportato, in ordine di priorità:

- Soggetti di età ≥ 18 anni con immunodeficienza congenita/acquisita o destinati a terapia immunosoppressiva (**priorità ALTA**)
- Soggetti di età ≥ 18 anni con insufficienza renale cronica e dialisi (**priorità ALTA**)
- Soggetti di età ≥ 18 anni con recidive o con forme particolarmente gravi di Herpes Zoster (**priorità ALTA**)
- Soggetti di età (≥ 18 anni) con diabete mellito
- Soggetti di età (≥ 18 anni) con patologia cardiovascolare previa valutazione del rischio
- Soggetti di età (≥ 18 anni) con BPCO e asma bronchiale

ALLEGATO 2.4

4. CAMPAGNA DI VACCINAZIONE ANTI – COVID 19

La campagna nazionale di vaccinazione autunnale e invernale anti COVID-19, al momento, si avvarrà della nuova formulazione del vaccino Comirnaty (JN.1), prodotto aggiornato e co-somministrabile con altri vaccini (con particolare riferimento al vaccino antinfluenzale). Come da Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto è prevista singola dose di Comirnaty JN.1 anche per coloro che non sono mai stati vaccinati (ciclo primario); la distanza dalla dose di vaccino anti-COVID-19 più recente deve essere di almeno tre mesi.

Elenco gruppi di Persone a cui viene raccomandata la vaccinazione di richiamo con il nuovo vaccino aggiornato:

1. Persone di età pari o superiore a 60 anni;
2. Ospiti delle strutture per lungodegenti;
3. Donne che si trovano in qualsiasi trimestre della gravidanza o nel periodo “postpartum” comprese le donne in allattamento;
4. Operatori sanitari e sociosanitari addetti all’assistenza negli ospedali, nel territorio e nelle strutture di lungodegenza; studenti di medicina, delle professioni sanitarie che effettuano tirocini in strutture assistenziali e tutto il personale sanitario e sociosanitario in formazione;
5. Persone dai 6 mesi ai 59 anni di età compresi, con elevata fragilità, in quanto affette da patologie o con condizioni che aumentano il rischio di COVID-19 grave, quali:
 - 5.1. Malattie croniche a carico dell’apparato respiratorio, inclusa l’asma grave, la displasia broncopolmonare, la fibrosi cistica, la broncopatia cronico ostruttiva-BPCO, la fibrosi polmonare idiopatica, l’ipertensione polmonare, l’embolia polmonare e le malattie respiratorie che necessitano di ossigenoterapia;
 - 5.2. Malattie dell’apparato cardio-circolatorio (esclusa ipertensione arteriosa isolata), comprese le cardiopatie congenite e acquisite, le malattie coronariche, lo scompenso cardiaco e i pazienti post-shock cardiogeno;
 - 5.3. Malattie cerebrovascolari;

- 5.4. Diabete/altre endocrinopatie severe quali diabete di tipo 1, diabete di tipo 2, morbo di Addison, panipopituitarismo;
- 5.5. Malattie neurologiche quali sclerosi laterale amiotrofica e altre malattie del motoneurone, sclerosi multipla, distrofia muscolare, paralisi cerebrali infantili, miastenia gravis, altre malattie neuromuscolari, patologie neurologiche disimmuni e malattie neurodegenerative;
- 5.6. Obesità (BMI >30);
- 5.7. Dialisi o insufficienza renale cronica;
- 5.8. Malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie, quali talassemia major, anemia a cellule falciformi e altre anemie croniche gravi;
- 5.9. Patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi, in attesa di trattamento o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure;
- 5.10. Trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva;
- 5.11. Trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro 2 anni dal trapianto o in terapia immunosoppressiva per malattia del trapianto contro l'ospite cronica);
- 5.12. Attesa di trapianto d'organo;
- 5.13. Terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule CAR-T);
- 5.14. Immunodeficienze primitive (es. sindrome di DiGeorge, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile etc.);
- 5.15. Immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es: terapia corticosteroidica ad alto dosaggio, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con rilevante impatto sulla funzionalità del sistema immunitario etc.);
- 5.16. Asplenia anatomica o funzionale Progressiva splenectomia o soggetti con indicazione alla splenectomia in elezione;
- 5.17. Infezione da HIV con sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), o con conta dei linfociti T CD4+ <200 cellule/ μ l o sulla base di giudizio clinico;
- 5.18. Malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinali;
- 5.19. Sindrome di Down;
- 5.20. Cirrosi epatica o epatopatia cronica grave;
- 5.21. Disabili gravi ai sensi della legge 104/1992 art. 3 comma 3.

La vaccinazione viene consigliata anche a familiari, conviventi e caregiver di persone con gravi fragilità. In fase di avvio della campagna, la vaccinazione, pur rimanendo raccomandata per tutti i gruppi di Persone indicati e disponibile anche per coloro che non rientrano nelle suddette categorie, sarà prioritariamente somministrata alle persone di età pari o superiore a 80 anni, agli ospiti delle strutture per lungodegenti, alle persone con elevata fragilità, con particolare riferimento ai soggetti con marcata compromissione del sistema immunitario.